

## RUSSULES poussant surtout sous conifères

(Auteurs pour photos : B : Borgarino, E : Eyssartiet et Roux 4e èd)

(Réaction au gaiac dans les 10 secondes)

ESPECE	CHAPEAU (cm)	LAMES-SPOREE	PIED	CHAIR	REACTIFS	AUTEURS	HABITAT
<b>R. sanguinea = R. sanguinaria</b> R. sanguine	(3-9) <b>rouge rosé à rouge sang</b> se décolorant	Blanc à <b>crème foncé un peu décurrentes</b> <u>sporée : ocre pâle</u>	<b>dur</b> , blanchâtre, lavé de rose-rouge	blanche, rose sous revêtement <b>savoir piquante</b> <b>odeur fruitée</b>	fer ocre gayac bleu vif	B 159 E 248	Conifères surtout pins
<b>R. emetica var silvestris</b> R. émétique des bois	(4-8) <b>rouge rosé vermillon palissant en rose à crème</b>	blanc à reflets jaunâtres	blanc crème	blanche, <b>fragile</b> <b>savoir amère, très piquante</b> <b>odeur fruitée</b> , noix de coco, poudre de réglisse	fer rose pale Gayac nul	B 156	<b>Feuillus mêlés</b> siliceux
<b>R. emetica var emetica</b> R. émétique des sphaignes	(10-12) rouge vif, chair sous-cuticule rosée	serrées, reflets rosés	élancé	Très âcre		B156	<b>Conifères acidophiles, sphaignes</b>
<b>R. badia</b> R. très âcre	(6-10) <b>rouge- pourpre à brun</b>	crème, jaune à ocre <u>sporée ocre foncé</u>	blanc, souvent <b>teinte rose</b>	ferme, savoir douce puis très piquante <b>odeur de bois de crayon</b>	fer rose orangé gayac bleu lent	B 161 E 250	Pins, épicéa en montagne
<b>R. lepida</b> Russula jolie	(5-12) mat <b>rose- rouge décoloré, dur</b>	Blanc à crème puis jaune arête +/- colorée de rouge <u>sporée crème pâle</u>	<b>dur</b> , blanc base lavée de rose	blanche, <b>dure</b> <b>savoir mentholée +/-douce</b> odeur fruitée	fer faible gayac faible à fort	B 168 E 178	conifères et feuillus
<b>R sardonina</b> R. sardoine	(4-10) <b>violacé, rouge-pourpre</b>	<b>crémecitrin vif</b> <u>sporée crème foncé</u>	blanc ± violacé, lavé de citrin	blanche lavé de citrin <b>savoir très piquante</b> <b>odeur fruitée</b>	fer rose pale gayac nul	B 159 E 248	pins uniquement sol non calcaire
<b>R. torulosa</b> R. épaisse	(4-10) <b>dur, rouge pourpre à violet</b> parfois olivâtre	blanc à crème <u>sporée ocre pale</u>	<b>robuste</b> <b>rose-pourpre</b>	blanche, dure +/- <b>brunissante</b> <b>odeur de pomme</b> <b>savoir âcre</b>	fer rose gayac nul	B 160 E 248	pins uniquement sur sol calcaire
<b>R. xerampelina</b> R. feuille morte	(5-12) <b>rouge, rouge pourpre à centre vineux noirâtre</b>	blanc crème puis ocre <u>sporée ocre</u>	blanchâtre <b>teinté de rose-rouge</b>	blanchâtre puis ochracé savour douce odeur de crustacé cuit	fer vert foncé gayac bleu assez vif	B.167 E 198	conifères surtout pins
<b>R. cessans</b> R. tardive	(2,5-6,5) rougeâtre, violacé ou cuivré puis bord cannelé	crème puis jaune-orangé, peu serrées <u>sporée jaune</u>	fragile un peu jaunissant	chair blanche savour douce, odeur faible	fer rosâtre sale gayac bleu assez vif	E 222	surtout pins espèce tardive

## RUSSULES NOIRCISANTES

GENRE	CHAPEAU	LAMES	CHAIR	PIED	CHIMIE fer	PARTICULARITES	HABITAT
<b>R. acrifolia</b> R. à lames piquantes	blanc à brunâtre <b>rougissant au toucher, lubrifié</b>	<b>assez serrées, + reflets rose</b>	<b>rosit +/- puis grisonne</b>	<b>rougissant au toucher</b>	verdâtre	<b>saveur âcre dans lames, odeur faible, un peu tonneau presque douce dans chair</b>	feuillus conifères
<b>R. adusta</b> R. brûlée	<b>brun rougeâtre</b> visqueux si humide	<b>peu serrées</b>	<b>rosit lent puis gris noir lentement</b>	base ridée, cabossée	rosâtre	douce, odeur faible vieux fut	conifères surtout
<b>R. atramentosa</b>	blanc puis noirâtre	<b>assez serrées</b>	<b>noircit sans rougir</b>	<b>noirâtre sans rougir</b>	rose puis vert vif	saveur douce puis mentholée	Chêne vert
<b>R. albonigra</b> R. blanche et noire	blanc puis vite <b>taches brunes puis noires</b>	<b>noircissantes au toucher</b> , moyennement serrées	<b>noircit presque sans rougir</b>	<b>noircissant au toucher</b>	rougeâtre	<b>douce puis mentholée</b> odeur faible	feuillus et conifères
<b>R. albonigra f. pseudonigricans</b>	idem	idem	<b>rougit nettement</b>	idem	rosâtre	idem	idem
<b>R. anthracina</b> R. anthracite	<b>gris puis noirâtre</b>	<b>assez serrées, blanches, grises puis noires</b>	<b>grisonne puis noircit sans rougir ou peu</b>	<b>grisonne puis noircit</b>	verdâtre léger	<b>saveur nett. piquante dans lames, moins dans chair</b> odeur faible, un peu fruitée	surtout feuillus
<b>R. densifolia</b> R. à dents serrées	blanc puis <b>brun au centre</b>	<b>serrées assez décurrentes</b>	<b>rougit en 5 min. puis noircit</b>	<b>gris puis brun</b>	vert sombre	saveur <b>douce</b> dans chair, +/- piquante dans lames	feuillus conifères rare
<b>R. nigricans</b> R. noircissante	blanc, vite <b>envahi de brun puis noir</b>	<b>très espacées, épaisses, rougit puis noircit au toucher</b>	<b>rougit en 5 min noircit : 1 h.</b>	<b>rougit et noircit</b> dans blessures	rosâtre	<b>saveur douce</b> odeur fruitée ou peu agréable : fromage	Feuillus conifères

## Tableau des Tricholomes "petits gris"

les "petits gris" (tous comestibles)

Nom	Chapeau (cm)	Lames	Pied	Saveur odeur
<b>T. squarrulosum</b> T. squameux	(4-8) couvert de squames noirâtres fond pâle, marge laineuse	grisâtres, arête ponctuées de noir	<b>squamules brunes à noires</b>	Saveur farine odeur farine poivrée feuillus, conifères
<b>T. atosquamosum</b> T. à squames noires	idem, trapu	moins serrées	plus clair, <b>peu ou pas squamuleux</b>	Idem
<b>T. terrum</b> T. terreux	(3-6) gris souris à noirâtre, fibrilleux	<b>gris pâle</b>	<b>blanc</b> à gris pâle, fibrilleux	odeur et saveur non farineuse <b>pins</b> , feuillus très rare
<b>T. scalpuratum</b> T. gravé	(3-6) fond pâle + squamules gris beige	blanches, <b>jaunissant avec l'âge</b>	<b>blanc</b>	odeur saveur farine <b>feuillus</b>

Autres tricholome " gris" (tous toxiques sauf le prétentieux, mais attention aux confusions)

<b>T. orirubens</b> T. à marge rougissante	(5-8) pâle, fibrilles laineuses gris-noir, bord +/- rosissant	blanchâtres, <b>rougissantes</b>	blanchâtre, base rouge + quelques taches bleu-vert	odeur, saveur farine feuillus
<b>T. basirubens</b> <b>T. à base rougissant</b>	(4-9) idem	arêtes ponctuées noir	blanchâtre, base rouge-rosé (adulte)	saveur farine peu agréable feuillus
<b>T. portentensum</b> T. prétentieux	(6-10) charnu fibrilles gris-noir	blanches, <b>lavées de jaune</b>	<b>blanc + teinte jaune</b>	<b>odeur, saveur farine surtout conifères</b>
<b>T. josserandii</b> T. de Josserand	(4-8) gris, fibrilleux, reflets métallisés	blanchâtres	blanc, long atténué à la base	<b>odeur farine rance surtout pin sylvestre</b>
<b>T. bresadolani</b> T. de Bresadola	Fond argenté, squames gris ardoise	grisâtres, arête ponctuée de noir	grisâtre, chair grise au grattage	Saveur amère puis âcre surtout sous chênes, sol calcaire
<b>T. sciodes</b> T. gris perfide	(3-9) fibrilleux, gris souris	blanches puis grises, arête ponctuée noir	blanc grisâtre, un peu pelucheux	<b>saveur amère sous hêtre</b>
T. pardinum Tricholome tigré	<b>(3-20) mèches gris-brun à gris-noir sur fond gris clair</b>	blanches + teinte glauque	blanc, un peu pelucheux	Saveur douce, odeur farine sous hêtre, épicéa en <b>montagne</b>